



Doctorand
**Raimon Ferré
Vallès**

Utilitat de la tonometria arterial perifèrica per a l'avaluació del risc cardiovascular

Director: Masana Marín, Lluís

Departament/Institut: Universitat Rovira i Virgili.

Departament de Medicina i Cirurgia

Data de defensa: 20-10-2011

Enllaç: <http://hdl.handle.net/10803/284829>



Resum de la tesi

Els treballs en què es basa la tesi doctoral demostren que la tonometria arterial perifèrica és una eina útil per detectar el risc cardiovascular, que s'associa a marcadors de disfunció endotel·lial, a lesió morfològica i rigidesa arterial i, que amb actituds terapèutiques com els canvis d'estil de vida es pot assolir millores en la reactivitat hiperèmica digital. Aquestes troballes poden ajudar a estratificar millor el risc cardiovascular dels pacients.

Els estudis que es presenten es basen en 816 pacients d'ambdós sexes i d'edat adulta, sense evidència de malaltia cardiovascular, reclutats de la consulta externa de la Unitat de Medicina Vascular i Metabolisme de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, amb risc cardiovascular estimat segons les taules de Framingham com risc moderat. Tal com es descriu en cadascun dels treballs, a aquestes persones se'ls va efectuar una visita mèdica, el consell sobre canvis terapèutics d'estil de vida, diverses anàlisis sanguínies i l'estudi d'arteriosclerosi subclínica consistent en ecografia carotídia i l'avaluació de la reactivitat i rigidesa arterial per tonometria perifèrica digital. Els resultats més rellevants demostren que la reactivitat arterial d'artèries de petita mida es relacionà de forma positiva amb els nivells de colesterol HDL i de forma negativa amb el tabaquisme, el perímetre abdominal i la triglicèridèmia. La rigidesa arterial central, mesurada segons l'índex d'augment, fou un dels principals determinants del gruix íntima-mitja carotídi, juntament amb el colesterol LDL i la pressió arterial sistòlica. En un treball prospectiu a 1 any, en 150 voluntaris d'aquests 816, es va examinar l'efecte dels canvis terapèutics dels canvis d'estil de vida sobre la reactivitat arterial perifèrica, observant que aquells pacients amb un major compliment presentaven millora en la funció endotel·lial i una menor progressió del gruix íntima-mitja carotídi. En un altre dels estudis presentats, l'índex d'augment mesurat a 125 pacients afectes d'hipercolesterolèmia familiar va associar-se directament amb el gruix íntima-mitja carotídi i els nivells d'Apo B100 a sèrum. Per tal de relacionar els resultats d'aquestes tècniques amb marcadors bioquímics de risc cardiovascular es van analitzar marcadors de funció endotel·lial. Els nivells alts de selectina-E, sVCAM i de la relació oxLDL/LDL van associar-se a una menor reactivitat hiperèmica arterial en un subgrup de 407 pacients. La FABP4, analitzada en 257 pacients, va associar-se a una pitjor funció endotel·lial en aquells amb diabetes mellitus tipus 2.

In memoriam el Dr Raimon Ferré Vallès ens va deixar el 13 de febrer de 2020.