



Tabaquisme passiu en nadons: efectivitat d'una intervenció breu

Directors: Martín Cantera, Carlos; Colomé Figuera, Lluís

Tutor: Àngel Bosch Gil, Josep

Departament/Institut: Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Medicina

Data de defensa: 29-10-2015

Enllaç: <http://hdl.handle.net/10803/316576>



Resum de la tesi

Avaluar si la intervenció breu en tabaquisme dirigida als progenitors de nadons de menys de 18 mesos i realitzada a la consulta de pediatria, és efectiva per disminuir l'exposició al fum ambiental del tabac als seus fills a dins de casa i al cotxe. Es van incloure nadons en el grup control on es feien les intervencions habituals en les visites del protocol del nen sa i el grup intervenció, on a més de les intervencions habituals, es realitzava una intervenció breu en tabaquisme als progenitors. Es mesurava el nivell de nicotina en els cabells del nadó, abans i després de la intervenció i també en els nadons del grup control.

Aplicació a la societat

A partir d'aquesta investigació i dels resultats de la tesi, es va afegir dins les intervencions que es fan en les consultes de pediatria d'atenció primària al nen sa, la intervenció en tabaquisme passiu, de manera que ha contribuït a disminuir l'exposició dels nadons al tabaquisme passiu.

