



Doctorand
**Jordi Fuertes
Manuel**

**Rescat axil·lar després de quimioteràpia
neoadjuvant en pacients cN1 de càncer de mama:
tècnica combinada gangli sentinella-roll axil·lar**

Directors: Gumà Padró, Josep

Codirectora: Luque Moreno, Verònica

Departament/Institut: Universitat Rovira i Virgili.
Departament de Medicina i cirurgia

Data de defensa: 08-07-2022

Enllaç: <http://hdl.handle.net/10803/674832>



Resum de la tesi

El maneig habitual en pacients amb càncer de mama que debuten amb afectació dels ganglis limfàtics axil·lars és l'extirpació de tots els ganglis (limfadenectomia). Aquesta pràctica comporta que apareguin diversos efectes secundaris, i entre aquests, el limfedema és el més important i invalidant. Facilitar durant l'acte quirúrgic, en pacients que han rebut quimioteràpia prèvia a la cirurgia, la tècnica combinada d'extirpació del gangli sentinella del tumor i també del gangli afecte abans del tractament quimioteràpic afavoreix que, en cas que cap dels ganglis tingui cèl·lules tumorals, s'eviti la limfadenectomia i, per tant, les seves conseqüències.

Aplicació a la societat

Aplicar la tècnica combinada descrita permet evitar la limfadenectomia en un gran nombre de pacients amb càncer de mama. Els efectes secundaris de la limfadenectomia són una causa important d'incapacitats laborals.

