

THE JOINT EWMA • GNEAUPP 2025 CONFERENCE

The 35th Conference of the European
Wound Management Association

In cooperation with GNEAUPP - the Spanish
Advisory Group for the Study of Pressure Ulcers
and Chronic Wounds



OTHER COLLABORATORS:



BARCELONA, SPAIN
26 — 28 MARCH
2025



BARCELONA, SPAIN
26 — 28 MARCH
2025

Salut/  Hospital Universitari
Sant Joan
REUS

**A PROPÓSITO DE UN CASO: APLICACIÓN TÓPICA
DE LA FÓRMULA MAGISTRAL A BASE DE MORFINA Y
LIDOCAÍNA EN HIDROGEL PARA LA REDUCCIÓN DEL
DOLOR EN UNA PACIENTE CON UNA LETÁLIDE
MAMARIA**

Ponente: Ana Isabel Fabregat Barrieras

 Generalitat
de Catalunya

THE JOINT EWMA·GNEAUPP 2025 CONFERENCE
BARCELONA, SPAIN · 26 — 28 MARCH 2025



OTHER COLLABORATORS:



Declaración de conflicto de intereses

☐ Declaro las siguientes consultorías pagadas o no pagadas, intereses comerciales, subvenciones y apoyo a la investigación o fuentes de pagos de honorarios durante los últimos tres años:

☒ Nada que declarar

ÍNDICE

1. CASO CLÍNICO
2. OBJETIVOS
3. INTRODUCCIÓN
4. MÉTODOS
5. DISCUSIÓN Y RESULTADOS
6. CONCLUSIONES


CASO CLÍNICO

**Carcinoma
Ductal
Infiltrante de
mama grado
2 -3**

ECOG 0


**Lesión de 16 x
13 cm de
diámetro**

- **Hipertermia**
- **Abundante exudado**
- **Dolor EN 7**
- **MF S/C (c/4h → 10mg)**
- **Labilidad emocional**



OBJETIVOS

General → Disminución del dolor



Específico → Mejorar el descanso nocturno

INTRODUCCIÓN: LETÁLIDES

1

¿Qué son las letálides o cutánides?

- Diseminación de células tumorales.
- Metástasis cutáneas.

2

Simptomatología


- Dolor
- Sangrado
- Mal olor
- Abundante exudado

3

Estadaje de las úlceras tumorales

- Primer escalón
- Segundo escalón
- Tercer escalón
- Cuarto escalón


INTRODUCCIÓN: EL DOLOR



FÓRMULA MAGISTRAL

Clorhidrato de Lidocaína 2,000%
Clorhidrato de Morfina 2,000%
Carmelosa Sódica
(Carboximetilcelulosa) 4,000%
Glicerina 5,000%
Agua Purificada (destilada)
250,000 CSP

MÉTODOS



A RESEARCH
NURSE


EDITABLE STROKE

RESULTADOS



Pre-aplicación

EN de 7 puntos



Se aplica FM

Aplicación de 4 horas



Post-aplicación

EN de 0 y 2 puntos



Progresión

**Mantiene EN de 0 y 2 puntos
durante 20 días hasta el alta
por mastectomía radical.**



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

	ARTÍCULO	AUTOR	AÑO	PACIENTE	DIAGNÓSTICO	LOCALIZACIÓN DE LA LETÁLIDE	TRATAMIENTO PREVIO	TRATAMIENTO	RESULTADO
1	Alivio del dolor con gel de morfina tópico en úlcera tumoral, a propósito de un caso (9)	Dña. Rosa Maria Alegre Martin, Dra. Nuria Quilez Salas, Dra. M ^a Elena Castro Vilela	2018	Mujer, 81 años	Cáncer lobulillar de mama izquierda	Cara antero lateral izquierda de la pared torácica	Paracetamol 1g c/8h vía oral. A nivel tópico: Lidocaína Viscosa al 2% tópica (efectivo durante un periodo de 30min a 2 horas); Lidocaína al 2,5% asociado a Prilocaina al 2,5% ambas tópicas (efectivo durante 6h).	Morfina gel, 10 mg/ml de sulfato de morfina (1 vial), usando como vehículo 8 gr Intralite Gel [®] (agua, propilenglicol y carboximetilcelulosa).	Su aplicación tópica derivó en una disminución significativa del dolor y malestar EVA basal 6-7, a EVA 2-1 post tratamiento, logrando un buen control analgésico por hasta 24 horas.
2	Topical Morphine in the Treatment of Painful Ulcers (16)	Ignazio Cutaia, Irene Parrino, Alessandra Casuccio	2005	Mujer, 76 años	Neoplásia de mama	Lesión maligna situada en esternón	Tramadol 100mg c/12h vía oral	Morfina gel, 10 mg/ml de sulfato de morfina (1 vial), usando como vehículo 8 gr Intralite Gel [®] (agua, propilenglicol y carboximetilcelulosa).	ENA (NRS): previo al tto tópico (6), día 1 (3), día 2 (1), día 3 (1), día 4 (0), día 5 (0), día 6 (0), día 7 (0)
				Varón, 56 años	Neoplásia de colon	Lesión maligna situada en esternón	Morfina 30mg c/12h vía oral	Morfina gel, 10 mg/ml de sulfato de morfina (1 vial), usando como vehículo 8 gr Intralite Gel [®] (agua, propilenglicol y carboximetilcelulosa).	ENA (NRS): previo al tto tópico (7), día 1 (1), día 2 (1), día 3 (2), día 4 (1), día 5 (1), día 6 (1), día 7 (1)
				Mujer, 71 años	Neoplásia de vulva	Lesión situada en la vulva	Morfina 30mg en infusión subcutánea	Morfina gel, 10 mg/ml de sulfato de morfina (1 vial), usando como vehículo 8 gr Intralite Gel [®] (agua, propilenglicol y carboximetilcelulosa).	ENA (NRS): previo al tto tópico (9), día 1 (5), día 2 (2), día 3 (1), día 4 (2), día 5 (2), día 6 (1), día 7 (2)

CONCLUSIONES

	ARTÍCULO	AUTOR	AÑO	PACIENTE	DIAGNÓSTICO	LOCALIZACIÓN DE LA LETÁLIDE	TRATAMIENTO PREVIO	TRATAMIENTO	RESULTADO
3	Topical morphine for treatment of cancer-related painful mucosal and cutaneous lesions: a double-blind, placebo-controlled cross-over clinical trial (17)	Aleksandra Ciałkowska-Rysz and Tomasz Dzierżanowski	2018	Grupo Placebo (n= 18), número total de pacientes: 35, media de edad: 61,6 años	Neoplasias de cuello uterino, pecho, recto, laringe, melanoma, paladar, piel, pulmón, glándula salival y linfoma.	Lesiones situadas en entropierna, pecho, sacro, ano, cuello, región parotídea, región submandibular, tibia, nariz y tronco.	Analgésicos opioides o no opioides sistémicos estables	Placebo	Alivio medio del dolor fue del 15,6%, después del placebo
				Grupo M (Morfina primero) n= 17, número total de pacientes: 35, media de edad: 61,6 años	Neoplasias de cuello uterino, pecho, recto, laringe, melanoma, paladar, piel, pulmón, glándula salival y linfoma.	Lesiones situadas en entropierna, pecho, sacro, ano, cuello, región parotídea, región submandibular, tibia, nariz y tronco.	Analgésicos opioides o no opioides sistémicos estables	Fórmula magistral: Sulfato de Morfina 0,2g, Glicerol 3,0g, Eucerina hasta 100g	Alivio medio del dolor fue del 57,5%, después del tratamiento con el ungüento
4	Eficacia de la aplicación de la fórmula magistral de morfina, lidocaína en hidrogel para la reducción del dolor en una úlcera tumoral, a propósito de un caso.	Ana Isabel Fabregat Barrieras	2024	Mujer, 52 años	Carcinoma ductal infiltrante (CDI) de mama izquierda de grado 2 - 3	Mama izquierda	Morfina 10mg por vía subcutánea	Fórmula magistral: Morfina al 2%, Lidocaína al 2%, Hidrogel en 250cc	ENA (NRS): previo al tto tópico (6 - 7), día 1 (1), día 2 (0), día 3 (1), día 4 (1), día 5 (0), día 6 (0), día 7 (0), día 8 (0)

BIBLIOGRAFÍA

1. Del Pilar. Lapeira Cabello José Manuel. Gómez Cano Soledad. Pérez Espina Rosa. Portillo Peña M. a José. Albert Yvonne Fernández Romero Rita. VMM un . GUÍA PRÁCTICA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ÚLCERAS TUMORALES. 2015.
2. Hospital Universitario Reina Sofía. GUÍA RÁPIDA DE CONSULTA PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON ÚLCERAS NEOPLÁSICAS. 2016.
3. Guía de Práctica de Lesiones Cutáneas Neoplásicas. Guía Práctica nº4. Sergas.gal. 2016. Disponible en: <https://ulcerasfora.sergas.gal/Informacion/PDFG4>
4. Úlceras neoplásicas [Internet]. CMUC. 2020 [citado el 18 de enero de 2024]. Disponible en: <https://www.centroulcerascronicas.com/noticias/ulceras-neoplasicas/>
5. SEOM. Las cifras del cáncer en España 2023. 2023.
6. Investigación RS. Revisión sobre las letálides cutáneas [Internet]. ▷ RSI - Revista Sanitaria de Investigación. 2023 [citado el 18 de enero de 2024]. Disponible en: https://revistasanitariadeinvestigacion.com/revision-sobre-las-letalides-cutaneas/?utm_content=cmp-true
7. Carvajal Valdy G. Eficacia de los opioides tópicos como analgésicos en enfermedades dolorosas cutáneas. Revisión de la literatura científica y propuesta metodológica para su evaluación clínica. Revista de la Sociedad Española del Dolor: RESED. 2015;14.
8. Murilo Pereira Flores, Anita Perpetua Carvalho Rocha de Castro, Jedson dos Santos Nascimento. Analgésicos Tópicos. Revista Brasileña Anestesiología. 2012;5.
9. Dña. Rosa María Alegre Martín, Dra. Nuria Quilez Salas, Dra. María Elena Castro Vilela. ALIVIO DEL DOLOR CON GEL DE MORFINA TÓPICO EN ÚLCERA TUMORAL, A PROPÓSITO DE UN CASO. Revista Atalaya Médica n o 14. 2018;33–6.

Salut/ Hospital Universitari Sant Joan REUS

 Av. del Dr. Josep Laporte, 2. 43204 Reus

 977 310 300

 www.hospitalsantjoan.cat

 info@hospitalsantjoan.cat

 @HospitalReus



Salut/



Hospital Universitari
Sant Joan
REUS

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

ana.fabregat@salutsantjoan.cat

27 de Marzo de 2025



Generalitat
de Catalunya